



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ**  
(МОЗ України)

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 232-01-04, Е-пошта: [info@moz.gov.ua](mailto:info@moz.gov.ua),  
веб-портал: [moz.gov.ua](http://moz.gov.ua) СДРНОЗ 00012005

27.08.2014 № 052-16/2014

**Керівникам структурних  
підрозділів з питань охорони  
здоров'я обласних та  
Київської міської державних  
адміністрацій**

Міністерство охорони здоров'я України, у зв'язку з численними запитаними щодо порядку використання вакцини для профілактики кору паротиту, краснухи для проведення щеплень контингентам різних вікових груп повідомляє:

Організації та проведення обов'язкових профілактичних щеплень контингентам різних вікових груп, який передбачено згідно з вимогами наказу МОЗ України від 26.06.2013 року № 1216 «Про проведення обов'язкових профілактичних щеплень проти кору за епідемічним показником», повинно здійснюватися в наступному порядку:

1. Вакцинація для профілактики кору контактних осіб проводиться дорослим віком до 30 років одноразово.

Щепленню підлягають особи, які:

- не мають зазначеного в анамнезі перебігу кору;
- або, не мають зазначеного в медичній документації двох щеплень для профілактики кору (відсутні 2 дози, або в анамнезі 1 доза щеплення проти кору);
- або, мають негативні результати лабораторного обстеження щодо наявності антитіл IgG;
- та, не мають протипоказань, що зазначені в інструкції для медичного застосування вакцини для профілактики кору, паротиту, краснухи.

Жінкам, які планують вагітність слід уникати вагітності не менше ніж один місяць після щеплення вакциною для профілактики кору, паротиту та краснухи.

2. Щеплення для профілактики кору дорослим проводиться одноразово комбінованою вакциною для профілактики кору, паротиту, краснухи, використовуючи для цього залишки вакцини, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2016, 2017 роки, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

3. Терміни введення вакцини проти кору, паротиту, краснухи особам які перебувати в осередку з хворими на кір, як найшвидше, в перші 72 години від часу контакту.

4. У разі, якщо минуло 72 години від часу контакту з хворим на кір, у випадку відсутності клінічних симптомів кору слід провести вакцинацію для профілактики кору, паротиту, краснухи як найшвидше, що забезпечить імунітет на майбутнє у випадку не інфікування.

5. Щеплення для профілактики кору осіб груп професійного ризику проводиться: медичних працівників, працівників освітніх закладів та немедичних працівників закладів здоров'я, представників силових структур (МВС, Міноборони, СБУ, Національна поліція, Національна гвардія, Прикордонна служба, служба охорони), а також – студентів навчальних закладів.

Першочергово щепленню підлягають особи з груп професійного ризику, які перебували в контакті або в осередку з хворими на кір.

Щеплення проводиться з розрахунку аби особа мала дві дози вакцини за життя. Мінімальний інтервал між двома щепленнями для профілактики кору має складати щонайменше 1 місяць.

При використанні вакцини КПК для проведення щеплень для профілактики кору особам з груп професійного ризику необхідно обов'язково враховувати достатню кількість її залишків для подальшого проведення щеплень дітям.

6. Щеплення вакциною для профілактики кору, паротиту та краснухи не проводиться вагітним жінкам. Непам'ятна вакцинація вагітних жінок, які не знали про свою вагітність, вакцинами для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи, не повинна бути причиною для перервання вагітності.

7. У районах з високим ризиком залворювання, рекомендований вік введення першої дози вакцини може бути перенесений на дев'ять місяців. За подібних обставин введена доза не враховується, як щеплення за віком.

Зазначену інформацію довести до відома медичних працівників підпорядкованих лікувально-профілактичних закладів та забезпечити її виконання.

Заступник Міністра з питань  
європейської інтеграції

Ольга СТЕФАНИШИНА